

# ด่วนที่สุด

ที่ สน ๐๐๒๓.๓/๑๔๖๗



ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐

๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปlodโroc คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชบัญญัติ  
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๒๓.๓/ว๑๙๙๑๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐  
๒. หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๒๓.๓/ว๗๐๒๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๙๑๐.๕/ว๑๐๔๒  
ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดสกลนคร ได้แจ้งแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๑ เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปlodโroc คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชบัญญัติ  
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และเงินอุดหนุนสำหรับ  
สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปlodโroc คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระราชบัญญัติศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี นั้น

เพื่อให้การดำเนินโครงการสัตว์ปlodโroc คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชบัญญัติ  
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
จึงขอให้อำเภอแจ้งแนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปlodโroc คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ เพิ่มเติม  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาดำเนินการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับเทศบาลนครสกลนครก็ให้พิจารณา  
ดำเนินการเช่นเดียวกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายนพดล ไพบูลย์)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร ๐-๔๒๗๑-๖๔๔๒

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

- งานบริหาร       กิจกรรมที่ไม่ทันท่วงที  
 ยุทธศาสตร์งาน       กิจกรรมการเงิน  
 รายงานสำหรับ

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑.๕/ ๙๐๘๖



สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

รับเลขที่ ๑๘๕๗ วันที่ ๑๘๕๗ ๒๕๖๑

๙๓๖๐

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เวลา ๑๔๐๐ น. ๒๕๖๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

รับท่านผู้อำนวยการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

๒๒๙๔

เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คุณปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชบัญญัติ ศกรฯ ฉบับเดิม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑.๕/๑๗๔๕ ลงวันที่ ๓๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑.๕/๑๗๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

สั่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คุณปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ เพิ่มเติม จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อ้างถึง ๑ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เก็บอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คุณปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชบัญญัติ ศกรฯ ฉบับเดิม พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวัลลักษณ์ อัครราชกุมารี และเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขั้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คุณปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชบัญญัติ ศกรฯ ฉบับเดิม พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวัลลักษณ์ อัครราชกุมารี นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คุณปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชบัญญัติ ศกรฯ ฉบับเดิม พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวัลลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งแนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คุณปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ เพิ่มเติม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทำเทศบัญญัติ ข้อนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้บรรจุ “โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า” หรือ “โครงการสัตว์ปลอดโรค คุณปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชบัญญัติ ศกรฯ ฉบับเดิม พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวัลลักษณ์ อัครราชกุมารี” ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และในเทศบัญญัติ/ข้อนี้เป็นที่เรียบร้อย ให้ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ ให้ดำเนินการ แก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นตามที่เปลี่ยนกรากรห่วงหาดใหญ่ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และตามหนังสือกระทรวงหาดใหญ่ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑.๓/ว.๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๒ โครงการที่เพิ่มขึ้นให้บรรจุในข้อนี้เป็นที่เรียบร้อย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทาง โดยกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีได้ตั้งงบประมาณโครงการสัตว์ปลอดโรค คุณปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชบัญญัติ ศกรฯ ฉบับเดิม พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวัลลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้พิจารณาโอนงบประมาณรายการที่เหลือจ่ายจากการก่อนหน้าหรือโครงการไม่มีความจำเป็นต้องจ่ายมาตั้งเป็นรายการใหม่โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบรหงหาดใหญ่ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗

๒. กรณีท่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้บรรจุ “โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า” ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ นท ๐๘๑๐.๕/ว ๐๑๒๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ อาจพิจารณาเพิ่มข้อความ “ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ” ไว้ท้ายข้อโครงการเดิม เพื่อให้สอดคล้อง กับงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน หรือพิจารณาดำเนินการตามข้อ ๑ ได้

๓. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ศึกษาวิธีการจัดเก็บวัคซีน การขนส่งวัคซีนที่ถูกต้อง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงข้อควรรู้ เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า แนวทางปฏิบัติเมื่อต้องนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน รวมถึงวิธีปฏิบัติเมื่อถูกสูนัขกัด อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ [www.dla.go.th](http://www.dla.go.th) ในส่วนของ “หนังสือราชการ” รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ  


(นายสมชาย ชัยมงคลไกวิทย)  
รองอธิบดี ปชช.และราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น  
ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๗ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๒๐๖๖

# แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระราชบัญญัติ “พระราชบัญญัติฯ” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เจ้าฟ้าฯ กรมพระราชวังลักษณ์ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม

## ๑. การปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น/การจัดทำเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติ

๑.๑ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทำเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้บรรจุ “โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า” หรือ “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชบัญญัติฯ ตามพระราชบัญญัติฯ” ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เมื่อได้รับการสนับสนุน งบประมาณให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑.๑.๑ ให้ดำเนินการ แก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๗๗ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๑.๒ โครงการที่เพิ่มขึ้นให้บรรจุในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทาง โดยกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีได้ตั้งงบประมาณโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชบัญญัติฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระราชวังลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้พิจารณาโอนงบประมาณ รายการที่เหลือจ่ายจากการก่อหนี้หรือโครงการไม่มีความจำเป็นต้องจ่ายมาตั้งเป็นรายการใหม่โดยอีกภูมิภาค ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗

๑.๒ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้บรรจุ “โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า” ไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น และในเทศบัญญัติ/ ข้อบัญญัติ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๑๗๖๐ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ อาจพิจารณาเพิ่มข้อความ “ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ” ไว้ท้ายข้อโครงการเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน หรืออาจพิจารณาดำเนินการตามข้อ ๑ ได้

## ๒. การตั้งงบประมาณ

รายการ	รายละเอียด	ลักษณะงบประมาณ
๒.๑ เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ จัดสรรงบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ ๓๐ บาท โดยจัดสรรตามจำนวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ จากการสำรวจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งหลักฐานการสำรวจให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (จัดบันทึกข้อมูลที่สำรวจจำนวนสุนัข/แมว หรือรายงานการสำรวจจำนวนสุนัข/แมว ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๑๗๖๐ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐)	๒.๑.๑ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง	ตั้งงบประมาณในหมวดค่าวัสดุ หรือหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวนโยบาย นโยบาย ภาระที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตามระเบียบ มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
	๒.๑.๒ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนโดยให้อีกภูมิภาค ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘	ตั้งงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนโดยให้อีกภูมิภาค ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

รายการ	รายละเอียด	ลักษณะประมาณ
<p>๒.๒ เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ</p> <p>จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามจำนวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ จากการสำรวจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งหลักฐานการสำรวจให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตัวละ ๖ บาทต่อปี (ซึ่ดีบันทึกข้อมูลที่สำรวจจำนวนสุนัข/แมว หรือรายงานการสำรวจจำนวนสุนัข/แมว ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มหาดไทย ๑๘๑๐.๕/๑๙๙๙ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยให้ทำการสำรวจปีละ ๒ ครั้ง ครั้งแรกภายในเดือนมีนาคม และครั้งที่ ๒ ภายในเดือนสิงหาคม</li> <li>- บันทึกข้อมูลในระบบ Thai Rabies Net: <a href="http://www.thairabies.net/trn">www.thairabies.net/trn</a> และ <a href="http://www.thairabies.net/petregis">www.thairabies.net/petregis</a> ในกรณีที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลในระบบดังกล่าวได้ ให้บันทึกข้อมูลจำนวนสุนัข/แมว ในรูปแบบเอกสารไฟล์ตามรูปแบบที่กำหนด และส่งข้อมูลดังกล่าวให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบซึ่ดีบันทึกข้อมูล หรือไปรษณีย์ อีเมลหรือนิคส์ hsw@dla.go.th ไปพลาสก่อน เมื่อสามารถบันทึกข้อมูลในระบบ Thai Rabies Net: <a href="http://www.thairabies.net/trn">www.thairabies.net/trn</a> และ <a href="http://www.thairabies.net/petregis">www.thairabies.net/petregis</a> ได้แล้ว จักแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในระบบต่อไป</li> </ul>	๒.๒.๑ กรณีจ้างเหมาบริการ	ตั้งงบประมาณในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ตั้งงบประมาณตามจำนวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของที่ได้จากการสำรวจ)
	๒.๒.๒ กรณีให้บุคลากรในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ	ตั้งงบประมาณในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวนองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการของเจ้าหน้าที่ห้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
	๒.๒.๓ กรณีให้บุคลากรในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการนอกเวลาราชการ	ตั้งงบประมาณในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภท ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
	๒.๒.๔ กรณีนอกเหนือจากรายการข้างต้น	ตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายให้ตรงตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่จะดำเนินการให้ครอบคลุมจำนวนสุนัขและแมวทั้งหมดก่อนการได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ไปพลาสก่อนได้

#### ๔. การจัดเก็บวัคซีน

๔.๑ ระบบลูกโซ่ความเย็น (Cold Chain) เป็นกระบวนการที่จะบริหารจัดการวัคซีน ให้คงคุณภาพดีจากผู้ผลิต ถึงผู้รับบริการ วัคซีนทุกชนิดจะต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม มีความเย็นเพียงพอที่จะคงคุณภาพได้ตลอดเวลาที่เก็บรักษาและขนส่งจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง

#### ๔.๒ คุณสมบัติวัคซีน

(๑) วัคซีนเป็นเชื้อวัตถุที่มีความไวต่อความร้อน และสูญเสียคุณภาพถ้าอยู่ในอุณหภูมิที่ไม่ถูกต้อง ถ้าวัคซีนเสียคุณภาพไปแล้ว แม้จะนำกลับมาไว้ที่อุณหภูมิที่ถูกต้อง ก็ไม่สามารถมีคุณภาพดีขึ้นเดิมได้

(๒) วัคซีนบางชนิดไวต่อความเย็น โดยเฉพาะเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า ๐ องศาเซลเซียส จะทำให้วัคซีนเสื่อมคุณภาพ

(๓) วัคซีนส่วนใหญ่มีความไวต่อแสงแดด จึงควรเก็บวัคซีนให้พ้นจากแสงแดด

#### ๔.๓ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรักษา

(๑) ตู้เย็นเก็บวัคซีนโดยเฉพาะ จำนวน ๑ ตู้ ที่มีลักษณะ ดังนี้

- ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๕ คิว

- ตู้เย็นชนิด ๑ หรือ ๒ ประตู ฝาประตูหันไปทาง แยกระหว่างซ้ายและขวาของอุณหภูมิ

#### ๒ - ๔ องศาเซลเซียส

- จำนวนกันความร้อนหนามีน้อยกว่า ๓๐ มิลลิเมตร

(๒) กระติก (Vaccine carrier) จำนวน ๑ ใบ ที่มีลักษณะ ดังนี้

- มีความหนาของชั้นวนไม่ต่ำกว่า ๓๐ มิลลิเมตร

- ปริมาตรความจุที่เก็บวัคซีน (Vaccine Storage Capacity) ไม่น้อยกว่า ๑.๗ ลิตร

- ไม่มีรอยแตกหักด้านในและด้านนอก สะอาด ฝากระติกปิดล็อกได้สนิท

- สามารถบรรจุของน้ำแข็งได้พอดีครบ ๕ ตัน

- รักษาอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง ๒ - ๘ องศาเซลเซียส อย่างน้อย ๒๔ ชั่วโมง

(๓) ช่องน้ำแข็ง ที่พอดีกับกระติก พร้อมไข่เจียว อย่างน้อย ๔ อัน

(๔) เทอร์โมมิเตอร์ ที่มีการสอบเทียบหรือเทียบเคียงแล้วปีละ ๑ ครั้ง จำนวน ๑ อัน

#### ๔.๔ วิธีการเก็บวัคซีน

##### เก็บในตู้เย็น

(๑) อุณหภูมิของตู้เย็นในช่องธรรมดาก oy ในอุณหภูมิ ๒ - ๘ องศาเซลเซียส ไม่ควรวางวัคซีนในช่องแข็งแข็ง และควรวางห่างจากฐานอย่างน้อย ๒๐ เซนติเมตร และห้ามเก็บวัคซีนที่ฝ่าตู้เย็น


(๒) การจัดเรียงวัคซีนในตู้เย็น: แยกเป็นสัดส่วน มีป้ายแสดงชื่อวัคซีนแต่ละชนิด และมีช่องว่างให้ความเย็นไหลเวียนได้ทั่วถึง วางให้ห่างจากผนัง

(๓) วัคซีนที่หมดอายุก่อน ให้จัดเรียงไว้ด้านนอก ส่วนวัคซีนที่เป็นใหม่ให้เก็บไว้ด้านใน ดูแลให้มีการจัดส่งหรือใช้แบบ First Expire First Out

(๔) ตรวจสอบอุณหภูมิเข้า (๔.๓๐ - ๕.๓๐ น.) และออก (๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) อย่างต่อเนื่องทุกวัน และควบคุมให้อยู่ในอุณหภูมิ ๒ - ๘ องศาเซลเซียส

(๕) บันทึกอุณหภูมิที่ตรวจสอบให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และเก็บไว้เพื่อตรวจสอบการทำงานของตู้เย็น ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน

(๖) กรณีไฟดับถ้าเครื่องปั๊มไฟชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ ภายใน ๓ ชั่วโมง ให้บ้ายวัคซีนทั้งหมดไปเก็บไว้ในกระติกหรือกล่องโฟมที่มีอุณหภูมิ ๒ - ๘ องศาเซลเซียส




รูปที่ ๕ การจัดเรียงวัคซีน

การเก็บวัคซีนในกระติกวัคซีน (Vaccine carrier) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งหรือเก็บวัคซีน ไว้ชั่วคราวเมื่อห้ามเย็น แต่มีขนาดเล็กกว่า และเก็บความเย็นได้นานเท่าหิบเย็น ควรเก็บความเย็นได้นาน อย่างน้อย ๒๔ ชั่วโมงและควรมีไอซ์แพค (Icepack) ที่มีขนาดพอดีที่จะจัดเรียงลงในกระติกโดยไม่เคลื่อนไปมา



ด้านหน้า

ด้านหลัง



- (๑) วางไอซ์แพคที่เริ่มละลายแล้ว (Conditioned icepack) ในด้านข้างทั้ง ๔ ด้านและด้านล่าง  
(๒) วางเทอนิโนมิเตอร์ลงกระติกวัคซีน แล้วปิดฝ่าประมาณ ๑๐ - ๑๕ นาที ตรวจอุณหภูมิให้ได้  
๒ - ๔ องศาเซลเซียส

(๓) นำวัคซีนใส่ถุงพลาสติก/ใช้กระดาษห่อ เพื่อป้องกันฉลากหลุดลอกและไม่ให้ขาดวัคซีนสัมผัสกับไอซ์แพคหรือน้ำแข็งโดยตรง ก่อนนำไปใส่กระติกวัคซีน


(๔) ในกรณีที่เป็นห็บเย็นหรือกระติกขนาดใหญ่ห่อวัคซีนแล้ววางไว้กลางกระติกและวางไอซ์แพคบนห่อวัคซีนก่อนปิดฝ่าในกรณีที่เป็นห็บเย็นหรือกระติกขนาดใหญ่

(๕) ปิดฝ่าให้สนิทและวางไว้ในที่ร่ม


(๖) ถ้ามีแผ่นฟองน้ำ (foam pad) วางใต้ฝ่าปิด จะช่วยกันความร้อนได้ และถ้ามีชุดวัคซีนที่เปิดใช้แล้วให้เสียบชุดวัคซีนไว้ที่แผ่นฟองน้ำ จะทำให้วัคซีนไม่ปนเปื้อนเมื่อวางแข็งอยู่ในน้ำที่ละลายจากไอซ์แพคบริเวณกันกระติก ในกรณีที่แผ่นฟองน้ำชำรุด ให้ตัดฟองน้ำ/ โฟมใส่แทน

(๗) กรณีไม่มีไอซ์แพค ให้ใช้น้ำแข็งแทน แต่ต้องมีปริมาณมากพอที่จะทำให้อุณหภูมิอยู่ระหว่าง  
๒ - ๔ องศาเซลเซียส

#### ใช้ Icepackที่เริ่มละลายแล้ว (Conditioned Icepack)




ก่อน




หลัง


#### ใช้กระดาษหนาแผ่น/ พลาสติก ป้องกัน




#### ห่อวัคซีนเพื่อไม่ให้แทกร้าวและฉลากเปียกน้ำ



## นำห่อวัคซีนใส่ในกระติกและวางฟองน้ำก่อน



## ตรวจสอบฝากระติกว่าปิดได้สนิทพร้อมขนย้าย



### (๖) การเก็บรักษาวัคซีนในขณะให้บริการ

- ควรให้บริการในที่ร่ม
- เก็บวัคซีนในกระติกหรือกล่องโฟมที่มีอุณหภูมิอยู่ในช่วง ๒ - ๘ องศาเซลเซียส
- วางขวดวัคซีนให้ตั้งตรง
- ห้ามวางขวดวัคซีนสัมผัสกับไอซ์แพคหรือน้ำแข็งโดยตรง
- ถูดวัคซีนใส่ช่องร่องแล้วให้บริการทันที ห้ามเตรียมไว้เป็นจำนวนมาก
- ห้ามมีเข็มปักคาดขวดวัคซีน ในระหว่างที่รอให้บริการ
- เปิดฝากระติกวัคซีนเมื่อจำเป็นเท่านั้นและควรปิดให้สนิท

## ๔.๕ การดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ Cold chain

### (๑) ตู้เย็น

- ทำความสะอาดรอบนอกตู้เย็น และขอบยางฝาตู้เย็นไม่ให้มีเชื้อราเกาะติด วางตู้เย็นตั้งตรงและห่างจากผาผนังแต่ละด้านไม่ต่ำกว่า ๖ นิ้ว

- ประดิษฐ์ตู้เย็นปิดสนิทป้องกันไม่ให้ความเย็นออก ตรวจสอบโดยใช้กระดาษ A4 สอดเข้าไปแล้วปิดฝาตู้หากสามารถถึงกระดาษออกได้ แสดงว่า ขอบยางเสื่อมและอาจทำให้ฝาตู้เย็นปิดไม่สนิท

- ปลั๊กตู้เย็น มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ มี Breaker เฉพาะของตู้เย็น หรือ ตู้เย็นใช้เต้าเสียบชนิดเดียว (ไม่ใช้ปลั๊กต่อพ่วง) พันเทปກาวปิดทับให้แน่น หรือ ตู้เย็นใช้หlayside เต้าเสียบ (ไม่ใช้ปลั๊กต่อพ่วง) ให้ใช้เทปກาวปิดช่องที่เหลือ

- ระยะน้ำแข็งในช่องแข็ง เมื่อเก็บนานเกิน ๕ มิลลิเมตร  
- ใส่ขวดน้ำที่มีฝาปิด (ปริมาณน้ำไม่ต่ำกว่า ๓ ใน ๕ ของขวด) หรือ Cool Pack ไว้ให้เต็มช่องแข็งพักหรือ ฝาประดิษฐ์ตู้เย็น เพื่อกีบรักษาอุณหภูมิตู้เย็นให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

(๒) กระติกหรือกล่องโฟม

- ล้างให้สะอาด และตากไว้ในที่ร่ม เมื่อแห้งสนิทแล้วให้เก็บไว้ในที่ร่มให้เรียบร้อย

- ตรวจสอบรอยแตกร้าว ถ้ามีผลต่อการเก็บรักษาอุณหภูมิ ต้องจัดหาใหม่

(๓) ของน้ำแข็ง

- เก็บในช่องแข็ง เพื่อหมุนเวียนออกนำไปใช้ เมื่อส่งกลับมา ให้ตรวจสอบรอยแตกร้าว ไม่ร้าวซึม

- ระดับน้ำในของน้ำแข็ง ต้องไม่นำกว่าระดับที่กำหนด เพราะน้ำที่แข็งตัวจะขยายออกจนทำให้แตกร้าวได้

(๔) เทอร์โมมิเตอร์

- แนะนำหรือวางไว้ขั้นกลางตู้เย็น บริเวณที่เก็บวัสดุที่ไวต่อความเย็นจัดมากที่สุด

- ระหว่างอยู่ให้หลุดหรือหล่นกระแทกพื้นตู้เย็นหรือพื้นห้อง เมื่อเวลาเปิด-ปิด ตู้เย็น

- สอนเทียบหรือเทียบเคียงกับเทอร์โมมิเตอร์มาตรฐานแล้วปีละ ๑ ครั้ง

ที่มา : ๑. มาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

๒. <http://www.guruvaccine.com/กระติกวัสดุ>

๓. ข้อมูลระบบลูกโซ่ความเย็น (Cold Chain) จากกรมปศุสัตว์

#### ๔. ข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

##### วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นวัคซีนเข็มตาย โดยการทำลายเชื้อจุลทรรศ์เพื่อไม่ให้ก่อโรค (ทั้งจากการใช้ความร้อนและสารเคมี) แต่ไม่ทำให้สารก่อภัยมีต้านทานเสียหาย ยังสามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้

##### สัตว์ชนิดใดบ้างที่ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด (โดยสัตวแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาในกรณีที่ไม่ใช่สุนัขและแมว) ที่มีสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และไม่อุญในสภาพแวดล้อม

เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้เมื่ออายุเท่าไหร่ และจะต้องให้จำนวนกี่ครั้ง  
เริ่มฉีดครั้งแรกที่ อายุ ๓ เดือน และฉีดครั้งต่อไปอีก ๑ เดือนหรือ ๓ เดือน จากนั้นฉีดครั้งต่อไปเป็นประจำทุก ๑ ปี

##### หลังจากสัตว์ได้รับวัคซีนแล้วต้องดูแลอย่างไร

๑. หลังฉีดวัคซีนควรพักดูอาการอย่างน้อย ๓๐ นาที ถึง ๑ ชั่วโมง ให้แน่ใจว่ามีอาการปกติ
๒. อาการที่อาจพบเป็นปกติหลังจากสัตว์ได้รับวัคซีนได้แก่ อ่อนเพลีย มีไข้ต่ำๆ หรือเบื่ออาหาร หากหลังจาก ๔๘ ชั่วโมง อาการดังกล่าวยังคงอยู่ควรปรึกษาสัตวแพทย์
๓. งดอาบน้ำหลังได้รับการฉีดวัคซีนเป็นเวลา ๗ วัน

##### อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังการฉีดวัคซีน

๑. มีอาการบวมแดงผื่นแพ้บริเวณที่ฉีดวัคซีน
๒. มีอาการชิม อ่อนเพลีย บางครั้งอาจพบร่วมไว้อีก
๓. อาการอื่นๆ เช่น อาเจียน หื้องเสีย ตาแดง ตาอักเสบ หากพบอาการดังกล่าว ควรรีบนำสัตว์เลี้ยงไปพบ สัตวแพทย์

##### หลังฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงจะมีภูมิคุ้มกันเมื่อไหร่

ประมาณ ๒ สัปดาห์ภายหลังจากการฉีดวัคซีน ร่างกายจึงจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรค โดยความลุ่มกรามในกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันของสัตว์แต่ละตัว ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย หากมีการติดเชื้อก่อนที่ระดับภูมิคุ้มกันจะสูงเพียงพอสัตว์ก็อาจเป็นโรคได้

อันตรายหากสุนัขของท่านได้รับการฉีดวัคซีนในกรณีเข่นนี้

วัคซีนที่ฉีดถูกเก็บรักษาไม่ถูกต้อง เช่น ไม่ได้แช่เย็น (๒-๕ องศาเซลเซียส) หรือผ่านการแข็งเย็น หรือวัคซีนวางคลุมลงแสงแดด วัคซีนปลอม ใช้น้ำใส่แทน หรือวัคซีนหมดอายุ

## โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ (Rabies, Hydrophobia) หรือในภาษาอีสานเรียกว่า “โรคหมาว้อ” เป็นโรคติดเชื้อไวรัสจากสัตว์สุกัน (Zoonosis) จัดเป็นโรคติดเชื้อที่ร้ายแรงที่ยังไม่มีทางเยียวยารักษา ผู้ป่วยทุกราย ที่มีอาการแสดงมักจะเสียชีวิตภายในเวลาเพียงไม่กี่วัน และในปีหนึ่ง ๆ จะมีผู้ที่เสียชีวิตจากโรคนี้อยู่พsom คน (แต่ในระยะหลัง ๆ นี้ในประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยที่เสียชีวิตลดลงเหลือปีละไม่ถึง ๑๐ ราย) ซึ่งผู้ป่วยมักมีประวัติถูกสุนัขกัดแล้วไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษความรุ้งเท่าไม่ถึงการณ์ แต่โรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตั้งแต่ถูกสัตว์ที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้ากัดใหม่ ๆ

องค์การอนามัยโลกรายงานว่า มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ประมาณปีละ ๓๕,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ ราย ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดในประเทศด้อยพัฒนาและกำลังพัฒนา โดยพบในประเทศอินเดียสูงสุดถึงประมาณปีละ ๒๐,๐๐๐ ราย ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างในประเทศไทยร้อยละ ๖๐ ของผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี ที่ถูกสุนัขบ้ากัดหรือข่วน ที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเป็นจำนวนมาก ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในเรื่องวัคซีนจำนวนมาก และนำความหวาดผวาหรือความวิตกกังวลมาสู่ครอบครัวของคนที่ถูกกัดมากน้ำ

## สาเหตุของโรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้อพิษสุนัขบ้า หรือ เชื้อไวรัสเรบีส (Rabies virus ซึ่งเป็น Lyssavirus type ๑ ในtribe Rhabdoviridae) ที่อยู่ในน้ำลายของสัตว์เลี้ยงสุกัดด้วยนม ที่พบรดับอยู่ที่สุด คือ สัตว์ในตระกูลสุนัข\* (ทั้งสุนัขบ้านและสุนัขป่า เช่น หมาป่า หมาจังจอก หมาใน) และสัตว์ตระกูลแมว (ทั้งแมวบ้านและแมวป่า) นอกจากนี้ยังอาจพบได้ในค้างคาว หมู วัว ควาย แกะ แพะ ม้า ลา อูฐ กระรอก พังพอน กระต่าย และสัตว์ในตระกูลหนู (ทั้งหนูบ้าน หนูนา หนูป่า)




IMAGE SOURCE : web.stanford.edu, [www.timesofisrael.com](http://www.timesofisrael.com)

เชื้อพิษสุนัขบ้าจะเข้าสู่ร่างกายได้ทางบาดแผลบนผิวนังที่ถูกสัตว์กัด ข่วน หรือเข้าผ่านทางรอยคลอกเล็ก ๆ น้อย ๆ ของแผลที่ถูกน้ำลายสัตว์ (แต่ถ้าผิวนังเป็นปกติ เชื้อจะเข้าไปไม่ได้) หรือเข้าผ่านทางเยื่อเมือกต่าง ๆ ได้แก่ เยื่อบุตา เยื่อบุจมูก เยื่อบุช่องปาก

นอกจากนี้ เข้อบังajanเข้าสู่ร่างกายได้จากการที่คนหายใจเอาละของในน้ำที่มีเชื้อโรคอยู่ (แต่ก็พบได้น้อยมาก เช่น การเข้าไปในถ้ำที่มีค้างคานอยู่กันเป็นล้าน ๆ ตัว หรือเป็นเจ้าหน้าที่ในห้องแล็บที่ต้องทำงานเก็บกับเชื้อไวรัสชนิดนี้) และมีรายงานด้วยว่า มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าจากการปลูกถ่ายกระจาดประมวล ๕ ราย จากทั่วโลก และจากการปลูกถ่ายอยู่ระหว่างนี้ ๆ ประมาณ ๓ ราย ซึ่งอาจเกิดจากผู้ป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าและไม่ได้รับการวินิจฉัยในตอนแรก

หมายเหตุ : ในบ้านเรานะสุนัขเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคพิษได้บ่อยที่สุดประมวล ๙๖% รองลงมาคือแมวประมวล ๓-๔% แต่ในประเทศไทยที่พัฒนาแล้วแทบจะไม่พบว่าสุนัขและสัตว์เลี้ยงในบ้านนิดเดียว ๆ เป็นสาเหตุของการเกิดโรค เนื่องจากนิการควบคุมการให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงอย่างงวดและไม่มีสัตว์จรจัดสั่งสัตว์ที่เป็นสาเหตุส่วนใหญ่มากกว่า ๘๐% จะเป็นสัตว์ป่า เช่น ลิง แรคคูน สุนัขจี้จอก

### การก่อโรคของเชื้อพิษสุนัขบ้า

วิธีก่อโรคทั้งในคนและในสัตว์จะคล้ายคลึงกัน ดังนี้ เมื่อเชื้อพิษสุนัขบ้าจากน้ำลายสัตว์เข้าสู่ร่างกายทางปากแลดและล้วน เชื้อจะอยู่บริเวณถ้ามีน้ำที่ใกล้ปากแลดและน้ำที่เข้าสู่ร่างกาย เช่น แมวแบบด้วยตัวเพิ่มจำนวนมากขึ้น แล้วจึงเดินทางเข้าไปในร่างกายส่วนปลาย เชื้อจะเดินทางต่อไปเพื่อไปยังไขสันหลัง (อัตราความเร็วในการเดินทางประมาณวันละ ๑๒-๗๕ มิลลิเมตร) เมื่อเชื้อเข้าสู่ไขสันหลังได้แล้ว ผู้ป่วยจะเริ่มแสดงอาการ (ระยะอาการนำของโรค) จากไขสันหลังเชื้อจะเดินทางเข้าสู่สมองอย่างรวดเร็วในอัตราความเร็วประมาณวันละ ๒๐๐-๔๐๐ มิลลิเมตร คันนั้น ยิ่งแพลงอยู่ใกล้สมองมากเท่าไร ระยะเวลาฟักตัวจะยิ่งสั้นเท่านั้น เช่น ผู้ที่ตุ่นกัดที่หน้าและศีรษะรุนแรงมากจะมีระยะเวลาฟักตัวสั้น

เมื่อเชื้อเข้าสู่สมองแล้วจะทำให้เกิดการอักเสบ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการทางระบบประสาท หลังจากนั้นเชื้อโรคจะเดินทางกลับเข้าสู่เส้นประสาทส่วนปลายอีกด้วย และเข้าสู่เนื้อเยื่อและอวัยวะต่าง ๆ ทั่วไปตามเนื้อฟ้าหันไป คงตัว หัวใจ ตับ ต่อมหมวกไต และที่สำคัญคือ “ต่อมน้ำลาย” ที่เชื้อจะสามารถแบ่งตัวเพิ่มจำนวนได้มากมาก เมื่อถูกสัตว์กัดจึงติดเชื้อที่มีอยู่ในน้ำลายของสัตว์นั้นเอง (ในบางครั้งเชื้ออาจเดินทางเข้าสู่สมองโดยไม่ต้องมีการอักเสบ การแบ่งตัวเพิ่มจำนวนก็ได้ ซึ่งจะทำให้มีระยะเวลางานฟักตัวอย่างโรคสั้นกว่า ๑ วัน หรือบางครั้งเชื้อถูกจ่อจ้าไว้ตั้งแต่ อุ้ยในเซลล์อื่น ๆ เช่น มาโครฟาจ (Macrophage) เป็นเวลาหน้าง่อนที่จะออกมายังเซลล์ประสาทก็ได้ ซึ่งจะทำให้ระยะเวลาฟักตัวของโรคหาย)

ระยะฟักตัวของโรคพิษสุนัขบ้า (ตั้งแต่ถูกกัดจนกระทั่งเกิดอาการ) คือ ๕ วัน ถึง ๔ ปี แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดช้า ในช่วง ๒๐-๔๐ วันหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับเชื้อ และมีส่วนน้อยที่จะพบอาการหลังจากได้รับเชื้อมาแล้วมากกว่า ๑ ปี (แต่เคยมีรายงานว่าผู้ป่วยบางรายอาจใช้เวลาถึง ๗๕ วันก็มี) ทั้งนี้ระยะเวลาฟักตัวของโรคจะสั้นหรือยาวก็ขึ้นอยู่กับ หลายปัจจัย ดัง บริเวณที่ถูกกัด ความรุนแรงของบาดแผลที่ถูกกัด ชนิดของสัตว์ที่กัด ปริมาณของเชื้อที่เข้าไปในบาดแผล และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาหลังถูกสัตว์กัด

### อาการของโรคพิษสุนัขบ้า

อาการของผู้ป่วยที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ระยะ คือ

๑. ระยะอาการนำของโรค (Prodrome) ผู้ป่วยจะมีอาการต่าง ๆ ที่ไม่เข้าเพาะ เช่น รู้สึกตัว ฯ ประชุมชา ๗๘.๕ องศาเซลเซียส หน้าวสั่น ปวดศีรษะ อัลตราซีน เบื้องอาหาร เจ็บคอ คลื่นไส้ อาเจียน ชาดหัว ท้องเดิน อาจมีอาการกระสับกระส่าย สูกตื้นหายใจติดกันงắt มีความวูบสีกากลัว นอนไม่หลับ อาจมีเปลี่ยนแปลงง่าย และอาการจำเนาะที่แพหอบสามารถใช้ในการวินิจฉัยโรคได้ คือ บริเวณบาดแผลที่ถูกกัดอาจมีอาการปวดเสียว คัน ชา เช่น หรือปวดแบบปวดร้อน (โดยที่แพลงอาจจะหายสนิทแล้วก็ได้) โดยจะเริ่มจากบริเวณบาดแผลก่อนแล้วจึงสามารถทั่วทั้งแขนและขา

๓. ระยะประภัยอาการทางระบบประสาท (Acute neurologic) เป็นอาการเฉพาะของโรคนี้ ซึ่งจะมีผล  
เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาการนำของโรคประมาณ ๒-๓๐ วัน ซึ่งในระยะนี้จะแบ่งอาการออกเป็น ๓ แบบ  
ได้แก่

- **แบบคุ้มค่า (Furious rabies)** ซึ่งเป็นก่อนหน้าให้ไปได้บ่อยที่สุดประมาณ ๘๐% ของผู้ป่วยโรคพัง  
สูนเข้าทั้งหมด ในระยะแรก ๆ ผู้ป่วยจะมีอาการไว้สับสน เห็นภาพหลอน กระวน  
กระวาย ซึ่งจะเกิดบ่อยเมื่อถูกกระตุนจากสิ่งเร้า เช่น แสง เสียง เป็นต้น ต่อมาจะมีอาการกระตุกของ  
ระดับความรู้สึกตัว ที่อ เดียวติด เดียวไม่ตัดสับกันไป ซึ่งในขณะที่ความรู้สึกตัวตื้น ผู้ป่วยจะพูดคุยคุกคัก  
ตอบโต้ได้บีบบัด แต่ในขณะที่ความรู้สึกตัวไม่ดี ผู้ป่วยจะมีอาการกระวนกระวาย ผดคลุกคลັງ  
เดินเพินพ่าน อยู่นึงไม่ได้ คลุ่มคลั่ง 例外อย่างรวดเร็วถ้ามีเสียงหรือหอยทำให้กลืนไม่ได้ แล้วไม่กล้าที่จะน้ำ  
ทึ้ง ๆ ที่กระหายน้ำมาก หรือบางรายแม้จะลอกส่วนตึงน้ำก็กลัวแล้ว) กลัวลม(Aerophobia;  
เห็นแผลเป็นเข้าที่หน้าหรือคอที่จะเรียกว่า เมื่อผู้ป่วยหายใจเข้าหรือเมื่อมามากจะระหบหน้า  
กระหบกกล้ามเนื้อกล้าม และกล้ามเนื้อขาอ่อนล้าเสียสิ ถ้าหากทำให้เกิดการแท็ก ก็จะต้อง  
ผิดปกติและก่อให้เกิดความเจ็บปวด ทำให้ไปอย่างหายใจเข้า ดูคล้ายคนกำลังล้าสักอย่างๆ ซึ่ง  
จะพบได้เกือบทุกราย แต่ไม่จำเป็นต้องพบร้ามเป็นทั้งสองอาการก็ได้ และอาการเหล่านี้จะหายไป  
เมื่อผู้ป่วยเริ่มเข้าสู่ระยะไม่รู้สึกตัว นอกจგนี้ อีกหนึ่งอาการตอนหายใจเป็นพัก ๆ (มักพเปในระหว่าง  
หลังของโรค) และอาการผิดปกติของระบบประสาทอื่นๆ ได้ เช่น น้ำลายไหล น้ำตาลัด เหื่อง  
ออกมาก ขนลุก และในผู้ชายอาจมีอาการเม็งตัวของอวัยวะเพศและหลังน้าอุจจาระ ซึ่งเกิดขึ้น  
เองโดยไม่ตั้งใจ และในพื้นที่ที่สูญเสียการรับรู้ทางประสาทสัมภาระ หนวดสติ หูดูดหายใจ และเสียชีวิตภายใน ๗  
วัน (โดยเฉลี่ย ๕ วัน) หลังจากเริ่มแสดงอาการ
- **แบบอัมพาต (Paralytic rabies)** ซึ่งเป็นก่อนหน้าที่หายไปเรื่อยๆ มาประมาณ ๒๐% ผู้ป่วยมีอาการ  
ไข้ร่วมกับกล้ามเนื้อแข็งชาและหัวร้าวแบบแรง มีอาการกลั้นปัสสาวะไม่ถู พบร้ามกระตุก  
น้าและกลัวลมบรรบาน ๕๐% ผู้ป่วยอุณหภูมิร่างกายจะเสียชีวิตหากว่าแบบคุ้มค่า ซึ่ง  
ประมาณ ๗๐-๘๐ วัน (ในบางครั้งผู้ป่วยจะมีน้ำเหลืองที่อุจจาระจากกลุ่มอาการกิลเลนแบร์ร์(  
(Guillain-Barre syndrome) ได้มาก)
- **แบบแสดงอาการไม่ตรงตัวแบบ (Non-classic)** ซึ่งนำไปในผู้วัยกลางคน โดยเฉพาะเด็กที่เป็น  
ผู้ป่วยที่ถูกต้านควรกัด ในระยะแรกผู้ป่วยอาจมีอาการปวดประสาทหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง ต่อมาก  
จะมีอาการแขนขาซึ่งหันไม่เป็นอัมพาตหรือชา มีอาการขึ้นลงและการเคลื่อนไหวผิดปกติ แต่รักษา  
พยาบาลยากว่า กลัวลม และอาการผิดปกติของระบบประสาทอื่นๆ ที่ผู้ป่วยแบบคุ้มค่า

๔. ระยะไม่รู้สึกตัว หรือ ระยะสุดท้าย (Coma) ผู้ป่วยทุกรายไม่ภาวะเมื่ออาการแสดงแบบใดเมื่อเข้าสู่ระยะ  
สุดท้ายนี้จะมีอาการหมดสติและเสียชีวิตจากระบบหายใจและให้สิ่งของให้ด้วยเหลว รวมทั้งหัวใจเต้นสิ่ง  
จังหวะ ภายใน ๗-๙ วันหลังมีอาการไม่รู้สึกตัว ถ้าผู้ป่วยมาโรงพยาบาลในระยะนี้แพทย์อาจวินิจฉัยโรคได้  
ยาก เพราะอาจเข้าใจผิดติดตัวเกิดจากโรคสมองอักเสบจากสาเหตุอื่นได้

IMAGE SOURCE : en.wikipedia.org (by Centers for Disease Control and Prevention)

อนึ่ง สำหรับในสัตว์ อาการจะคล้าย ๆ ในคน แต่การกำเนิดของโรคจะเร็วกว่าและเสียชีวิตเร็วกว่าในคน

## อาการโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข/ในแมว

สุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเปลี่ยนจากการอุกเป็น ๒ แบบ ได้แก่

๑. แบบดุร้าย สำหรับสุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ามากก็จะแสดงอาการแบบดุร้าย โดยในระยะแรกจะเป็นสุนัขจะมีลักษณะผิดไปจากเดิม เช่น สุนัขที่เคยคลุกคลีกับเจ้าของจะแยกตัวและมีการมันหูตุดหงิค หรือสุนัขที่ไม่เคยคลุกคลีกับเจ้าของลืมหายใจเดล้าเดลีอย่างช้าๆ อง แล้วอีก ๒-๓ วันต่อมาจะเข้าสู่ระยะตื้นเต้น โดยสุนัขจะจับหมกตัวอยู่ตามมุมเมื่อต ตอบสนองให้ไวต่อเสียงและสิ่งกระตุ้นต่าง ๆ ต ่อมากับสุนัขจะมีอาการกระวนกระวาย อาเจียนและแสดงอาการรับแมลงหรือวัตถุที่ขวางหน้า เช่น ก้อนหิน ต ิน เศษไม้ แล้วจะเริ่มออกมาระบุ พล่าน ดุร้าย กัดคน สัตว์ และทุกสิ่งที่ขวางหน้า สุนัขจะมีอาการเสียเท่าหอนผิดปกติ สิ่นห้อย น้ำลายไหลยิ่ด ต ่อมากจะมีอาการขาอ่อนเปลี้ยลง ลำตัวหักเป็นซี่ ช้ำสุนัขจะแสดงอาการในระยะตื้นเต้นนี้ประมาณ ๑-๓ วัน ในช่วงสุดท้ายอาจมีอาการชักแล้วตาย หรือเข้าสู่อาการระยะสุดท้ายคือ ระยะร้อนพานา โดยสุนัขจะเกิดอาการร้อนพานาทั้งตัว สุนัขจะล้มลงแล้วลุกขึ้นไม่ได้และมักจะตายภายใน ๒-๓ วัน
๒. แบบเชื่องชึม จะค่อนข้างสั้นกว่าแบบดุร้ายหนึ่งอันสัตว์เป็นโรคอื่น ๆ เช่น โรคหัด สุนัขที่แสดงอาการแบบเชื่องชึมจะใช้ ๕๖๘ นอนชุม ไม่ทานอาหารและน้ำ ชอบอยู่ในที่มืด ๆ เมฆ ฯ และไม่แสดงอาการดุร้าย แต่จะกัดหรือบีบคนหรือสัตว์อื่นเพื่อถูกรบกวนหรือถูกปั้งคีบหรือเมื่อผู้เลี้ยงเอาน้ำอาหารหรือยาไปให้ หรืออาจแสดงอาการคล้ายกับมีก้านหรือกระดูกติดคอ เช่น ไอ ไข้ ชาต คุยคอ ต ่อมาก เมื่ออาการกำเริบมากขึ้นจะเดินไม่แนบปะปะ เป็นอัมพาตทั้งตัว และมักตายภายใน ๑๐ วันหลังแสดงอาการ (ส่วนใหญ่คือประมาณ ๔-๙ วัน) โดยไม่แสดงอาการกลับวันแบบที่พบร ในการ

**ข้อสังเกตเพิ่มเติม :** สุนัขตัวผู้จะเป็นโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่าสุนัขตัวเมีย สุนัขที่มีอายุน้อยจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่าสุนัขที่มีอายุมาก และสุนัขทุกต ลุกจะมีโอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้เท่ากับสุนัขใด

## การวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า

เนื่องจากอาการของโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงระยะอาการนำข้อมูลจะเป็นอาการที่ไม่จำเพาะ และอาการแสดงที่มีในระยะปฐมของการทางระบบประสาทในช่วงแรกก็คือลักษณะไข้และชาจากเสื้ออ่อน ๆ รวมทั้งประวัติการถูกสัตว์กัดในผู้ป่วยที่อาจจะไม่ชัดเจน แพทย์จึงต้องอาศัยการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเพาะเพื่อช่วยอันมั่นคง วินิจฉัยว่าอาการที่ปรากฏนั้นจากโรคพิษสุนัขบ้าไม่ใช่จากเชื้ออื่น ๆ เพราะถ้าเป็นเชื้ออื่นบางชนิด เช่น เชื้อไวรัส แพทย์จะให้การรักษาโดยการให้ยาที่จำเพาะต่อไวรัสเริ่ม เป็นต้น โดยวิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการดังกล่าวทั้งนี้ได้แก่

๑. Direct fluorescent antibody test เป็นการตัวเข้มที่มีความจำเพาะสูงมาก แต่ในเมืองไทยหาซื้อได้ยาก ด้วยวิธีการใช้สารเรืองแสง ซึ่งจะพบเชื้ออยู่บริเวณเล็บประสาทได้ต่ำมาก ซึ่งเป็นวิธีที่มีความแม่นยำสูง
๒. RT-PCR เป็นการตรวจหาเชื้อไวรัสจากน้ำลาย น้ำไขสันหลัง หรือเนื้อเยื่ออื่น ๆ จากผู้ป่วย โดยเป็นการตรวจหาสารพันธุกรรมที่จำเพาะต่อเชื้อไวรัส ซึ่งเป็นวิธีที่มีความแม่นยำสูงที่สุด แต่มีราคาแพง
๓. การตรวจหาสารภูมิต้านทานที่จำเพาะต่อเชื้อไวรัส ซึ่งเป็นวิธีที่มีความแม่นยำได้ดีมาก
๔. ในกรณีที่ผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว เมื่อนำมาฟอกไปผ้าพิสูจน์จะพบลักษณะของเซลล์ประสาทที่มีความจำเพาะกับโรคนี้มาก ที่เรียกว่า “เนกรินบอดี้ส์” (Negri bodies) อยู่ภายในเซลล์

ส่วนการตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่น ๆ ที่ไม่จำเพาะต่อโรคพิษสุนัขบ้า อาจใช้ตรวจให้อาชญากรรมโดยอิสระ ที่บุคคลนั้นได้ ได้แก่

- การตรวจเลือดชีบีซี (CBC) ส่วนใหญ่จะพบว่าปั๊บที่ต่ำและแตกต่างจากเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคสูบง่าย เช่นเชื้อที่มีเดลีออดดาวของผู้ป่วยจะชั้นสูง
  - การตรวจน้ำไขสันหลัง ซึ่งจะพบเม็ดเสือดาวสูง ทราบโดยปกติในน้ำไขสันหลังจะมีเม็ดเสือดาวต่ำ
  - การถ่ายภาพสมองด้วยคอมพิวเตอร์ (MRI) ซึ่งจะไม่พบความผิดปกติ
- สิ่งที่ตรวจพบในผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า
- แพทย์มักตรวจพบว่า ผู้ป่วยมีไข้ สับสน กระวนกระวาย เดชะชาลัด แพะที่สำคัญคือ อาการกล้ามเนื้อชา แข็งเกร็งกล้าม บางรายอาจมีอาการแขนขาอ่อนแรง ร้าว疼 เด็กเร่งรีบ ซัก หรือหมัดสตี

## การพิจารณาความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าจากลักษณะการสัมผัสถกับสัตว์

ในการจะพิจารณาว่าผู้ป่วยรายใดที่ถูกสัตว์สัมผัส กัด หรือชswagen จำเป็นต้องมีด้วยกันพิษสุนัขบ้าและอิมมูโนโลจี ลินหรือไม่นั้น ในแต่ละประเทศจะมีแนวทางการรักษาที่ไม่เหมือนกัน ทั้งนี้เป็นเพราะการควบคุมการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์มีความเข้มข้นแตกต่างกันและมีความตุกตุ่นของสัตว์ที่เป็นโรคไม่หายกัน สำหรับประเทศไทยนั้นมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

ระดับความเสี่ยงของการ  
สัมผัสโรค

ลักษณะการสัมผัส

แนวทางการปฏิบัติ

๑. ถูกตัวสัตว์ ป้อนอาหาร ป้อนน้ำ โดยที่ผิวนังไม่มี

ระดับที่ ๑ (การสัมผัสที่ไม่ แหล่งหรือรอยคลอก  
ติดโรค)

๓. ล้างบริเวณที่สัมผัส

๒. ถูกสัตว์เลีย สัมผัสน้ำลายหรือเลือดของสัตว์  
โดยที่ผิวนังไม่มีแหล่งหรือรอยคลอก

๔. ไม่ต้องฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า

ระดับที่ ๒ (การสัมผัสที่มี  
โอกาสติดโรค)

๑. ถูกเลีย โดยน้ำลายถูกผิวนังที่แหล่งหรือรอย

คลอกหรือรอยขีดข่วน

๕. ล้างและรักษาแผล

๒. ถูกกัดเป็นรอยข้ามผิวนัง โดยไม่มีเลือดออกหรือ  
เลือดออกขึ้น ๆ

(Rabies  
vaccine)\*

๓. ถูกข่วนที่ผิวนังเป็นรอยคลอก มีเลือดออกขึ้น ๆ

๔. ถูกเลีย หรือน้ำลายสิ่งคัดหลังถูกเยื่อบุของตา  
จมูก ปาก หรือแผลลึก แหล่งที่มีเลือดออก

๕. ถูกข่วน จนผิวนังขาดและมีเลือดออก

๖. ล้างและรักษาแผล

๖. ถูกกัด โดยพิษสัตว์ทางหลุมผ่านผิวนัง เป็นแหล่ง

๗. ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า (Rabies  
vaccine)\* และอัมมูนิโกลบูลิน  
(Rabies immune  
globulin)\*\* โดยเร็วที่สุด

ระดับที่ ๓ (การสัมผัสที่มี เตียหรือulatory แหล่งและมีเลือดออก  
โอกาสติดโรคสูง)

๑. มีแหล่งที่ผิวนัง และสัมผัสถูกสิ่งคัดหลังจาก  
ร่างกายสัตว์ ชากระดับ เนื้อสมองของสัตว์ รวมทั้งการ  
ข้ามและชากระดับ และลอกหนังสัตว์\*\*\*

๒. กินอาหารที่ปรุงจากสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่  
เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

หมายเหตุ : \* จชหยดฉีดเมื่อสัตว์ (เฉพาะสุนัขและแมว) เป็นยาติดต่อและระยะเวลา ก้าวเข้าไปอีก ๑๐ วัน

\*\* กรณีที่ถูกกัดเป็นแหล่งที่บริเวณใบหน้า หูรูป% คอ เมือ และน้ำมูก หรือเป็นแหล่งลึก แหล่งลึกมาก หรือถูกกัดมา  
หลายแหล่ง ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสูงและมีระยะเวลาฟื้นตัวของโรคสั้น แพทย์จึงจำเป็นต้องฉีดวัคซีน  
โกลบูลินโดยเร็วที่สุด (แต่ถ้าฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเข้มแรกไปแล้ว ๘ วัน ก็ไม่ต้องฉีดอัมมูนิโกลบูลิน เนื่องจากผู้ป่วย  
จะมีภูมิคุ้มกันก็ได้ขึ้นแล้ว) และต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการล้างแผลตัวยาน้ำสะอาดกับสนู๊ฟ น่องจากผู้ที่ถูกกัด  
และได้รับการรักษาเดียวกันจะเป็นผู้ที่ถูกกัดที่ใบหน้า ศีรษะ คอ แขนทั้งสอง

\*\*\* พิจารณาความเสี่ยงมากน้อยตามลักษณะเป็นราย ๑ ไป

## **การปฐมพยาบาลและแนวทางปฏิบัติเมื่อสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า**

ผู้ที่ถูกสุนัข แมว ค้างคาว สัตว์ป่า สัตว์ทะเล หรือปศุสัตว์รังกัด ชews หรือเลีย การปฎิบัติต่อไปนี้

๑. ให้รับฟอกล้างบาดแผลด้วยน้ำสะอาด (เช่น น้ำขวด น้ำก้อก หรือน้ำต้มสุก) กับสบู่ หรือล้างแผลด้วยน้ำเกลือล้างแผล Normal saline โดยเร็วที่สุด โดยควรล้างหลาย ๆ ครั้งเพื่อข่วยลดปริมาณของเชื้อพิษสุนัขบ้าที่บาดแผลและล้างให้ลอกถึงก้นแผลอย่างน้อย ๑๕ นาที (ขั้นตอนนี้สามารถทำว่ายieldได้เชื้อพิษสุนัขบ้าออกจากบริเวณบาดแผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ) แล้วให้เช็ดแผลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น สารละลายโพวิโดน-ไอโอดีน (Povidone-iodine) หรือไฮบิเทนในน้ำ (Hibitane in water) แต่ถ้าไม่มีให้ใช้แอลกอฮอล์ ชนิด ๗๐% หรือทิงเจอร์ไฮโอดีน โดยให้เช็ดจนกว่าแผลจะสะอาดไม่เหลือคราบ และอย่าใส่สิ่งอื่น ๆ เช่น ครีม เกลือ ชี้ฟังบาร์ม (ยาหม่อง) หรือยาฉุนลงในแผล และไม่ควรใช้รองเท้าตอบแผล เพราะอาจทำให้เชื้อกระจายไปรอบบริเวณที่เกิดแผลได้ง่าย และอาจมีเชื้อโรคอื่นเข้าไปด้วยทำให้เกิดแผลอักเสบ
๒. ถ้ามีเดือดออก ควรปล่อยให้เลือดไหลออก อย่าบีบหรือჭักบาดแผล เพราะจะทำให้เชื้อกระจายไปเป็นรูปวง อื่น
๓. รีบไปพบแพทย์/สถานพยาบาลใกล้บ้านโดยเร็วที่สุดทันที อย่ารอจนอนใจ เพราะอาจสายเกินไป เป็นที่แพทย์จะได้ประเมินและทำการรักษาอย่างเหมาะสมต่อไป เช่น การทำความสะอาดบาดแผลและรักษาบาดแผล การให้ยาปฎิชีวนะหรือยาแก้ปวดตามอาการ การฉีดยาป้องกันบactetaphage รวมถึงการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าและอิมมูโนไกลูลินเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วย (แพทย์อาจพิจารณาไม่ฉีดวัคซีนให้ในกรณีไม่มีแผลหรือรอยดูดออก เป็นเพียงการถูกเลียหรือสบัมสัมภัยสัตว์บริเวณผิวนังปูกด) หากแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านแล้ว หลังจากนั้นถ้ารู้สึกว่ามีพิษร้าบตื้นๆ ให้เก็บขึ้น เช่น ปอดแข็งมากขึ้น มืออาภารบวบขึ้น หรือมีไข้ตัวร้อน ควรรีบกลับไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาภาวะแทรกซ้อน
๔. ควรกักขังและเฝ้าดูอาการสัตว์ที่ก่อเหตุเป็นเวลาอย่างน้อย ๑๐ วัน (ไม่ควรกำจัดสัตว์โดยไม่จำเป็น ควรปล่อยให้สัตว์ตายเอง เพราะจะทำให้ต้องพนันว่าได้ง่ายและแน่นอนกว่า) แต่ในกรณีที่สัตว์น้ำดี ร้าย กัดคน หรือกัดสัตว์อื่น หรือสัตว์น้ำดีจับตัวไว้จะหาว่าได้ยาก เช่น สัตว์บ้า ค้างคาว หนู ชุบะหนู หรือแม่จรจัดที่อาจหนีหายไป หรือไม่สามารถกักหัวสัตว์ไว้ได้ ถ้าเป็นไปได้ควรหาทางกำจัดและนำสัตว์น้ำดีน้ำลงตรวจ แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อพิจารณาว่ามีป่องกัน
๕. หากสัตว์ตายแล้วให้นำมาส่งตรวจเชื้อที่ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล ซึ่งในการส่งหากตรวจวินิจฉัยให้เร็วที่สุดภายใน ๒๔ ชั่วโมง (ในขณะเก็บมาจากสัตว์ควรสวมถุงมือยางและถ้าไม่หลังจากเก็บมาจากให้สะอาด) และควรส่งตรวจเฉพาะส่วนหัวของสัตว์ (เชือกและลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อที่ซักเจนที่สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำจะอยู่ที่ส่วนหัว) หรือหากเป็นสัตว์ด้วยเล็ก ๆ สามารถส่งตรวจได้ทั้งตัว
  - สัตว์ที่ส่งตรวจจะต้องใส่ถุงพลาสติกให้มิดชิด ห่อด้วยกระดาษหอย ฯ ชั้น แล้วใส่ถุงพลาสติกอีกชั้นหนึ่งและปิดปากถุงให้สนิทเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสแพร่กระจาย สาบานนี้ให้ไปใส่ในภาชนะเก็บความเย็นที่บรรจุน้ำแข็งให้เย็นตลอดเวลา เช่น กระติก ก๊อกอัตโนมัติ ก๊อกไฟฟ์ พรีเซิลกับปิดช่อง-นานาสูตร ที่อยู่ เบอร์โทรสัพท์ของผู้ส่งตรวจ วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่างส่งตรวจ ประวัติของสัตว์ ขนาด เพศ อายุ สี และอาการป่วย และวันน้ำที่ห้องปฏิบัติการขอใบอนุญาตห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลทันที
  - สั่งให้ต้องระวางให้มากต่อ ผู้ที่ตัดหัวสัตว์จะต้องไม่มีแผลที่มือและต้องใส่ถุงมือยางหนา ส่วนเศษสัตว์ที่เหลือให้ฝังลึกประมาณ ๖๐ เซนติเมตร มิดที่ใช้หลังตัดหัวสัตว์และเคลื่อนย้ายที่ใช้ตัดหัวนำมายังชักฟอกหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทันที

## วิธีรักษาผู้ที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อพบผู้ป่วยที่ถูกสัตว์ที่เป็นโรคหรือสงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด ช่วง หรือเลีย ควรให้การดูแลรักษาดังนี้

๑. การรักษาบาดแผลตามลักษณะของแผลที่ถูกสัตว์กัด ถ้าผู้ป่วยยังไม่ได้ฟอกล้างบาดแผลมาก่อนมันก็จะว่าได้รับการปฐมพยาบาลมาอย่างดีแล้ว แพทย์/พยาบาลอาจล้างแผลซ้ำ ใส่ยาชาเข้าไป ปิดแผลด้วยผ้ากันน้ำ และอาจไม่เย็บแผลที่สัตว์กัดทันที หากอาการทำให้เกิดการติดเชื้ออักเสบเป็นหนองได้ (ยกเว้นถ้าหัวเลือด หรือบาดแผลกระชุงจะรุนแรงมากหรือเป็นแผลใหญ่ จึงจะเย็บไว้หลอม ๆ) แต่ถ้าจำเป็นต้องเย็บแผล ให้ทำแผลให้ศักระยะหนึ่งก่อน แล้วค่อยเย็บบีดในภายหลัง
๒. การให้รับประทานยาปฏิชีวนะ (เพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย) เช่น อิริทรามัยซิน (Erythromycin), ไซโพรล็อกซาซิน (Ciprofloxacin) หรือโคอะม็อกซิกลาว (Co-amoxiclav) เป็นเวลา ๓-๕ วัน ซึ่งแพทย์จะพิจารณาให้เพื่อป้องกันการติดเชื้อในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นบาดแผลขนาดใหญ่ เป็นบาดแผลบริเวณนิ้วมือ บาดแผลลึกถึงกระดูก ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันของพ่อแม่ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคไตวาย ตั้งครรภ์ หรือผู้ติดม้ามอกไปแล้ว หรือในการที่บาดแผลมีลักษณะรุนแรง แต่ร้อน มีหนอง (หากมีความรุนแรงมากจะอาจให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล)
๓. การฉีดยาป้องกันบาดทะยัก ในกรณีที่ผู้ป่วย尚未ได้รับวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักมาแล้วอย่าหันมือบากครั้ง และได้เข้มสุดทั้งนานกว่า ๕ ปีนาแล้ว แพทย์จะฉีดวัคซีนบาดทะยักเข้ากล้ามเนื้อให้ ๑ เข็ม แต่ถ้าผู้ป่วยไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักมาก่อน แพทย์จะให้จำนวน ๓ เข็ม ต่อ วันที่ ๐ (วันแรก) เดือนที่ ๑ และเดือนที่ ๒
๔. การฉีดยาป้องกันแก่ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า แพทย์จะพิจารณาถึงความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพิษสุนัขบ้า (ตามตารางการพิจารณาความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าจากศักยภาพการสัมผัสด้วยสัตว์) และให้คำแนะนำรักษาเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าดังนี้
  - ความเสี่ยงระดับที่ ๑ ไม่ต้องฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าและวัณโรค และวัณโรคไม่ต้องฉีดวัคซีนโกลบูลิน
  - ความเสี่ยงระดับที่ ๒ และ ๓ แพทย์จะพิจารณาจากสัตว์ที่ก่อเหตุดังนี้
    ๑. ถ้าเป็นสุนัขหรือแมวที่มีอาการมีดีบุกหรือบ้าและอิมมูโนโกลบูลิน
    ๒. ถ้าเป็นสุนัขหรือแมวที่มีอาการปกติ แพทย์จะพิจารณาฉีดวัคซีนโกลบูลิน ๑ วันหลังจากสัตว์เลี้ยงได้รับการฉีดวัคซีนปีก ๑ วัน ใช้พิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องในช่วง ๒-๓ วัน ที่จะต่อมา และ ๓. การที่ดูหรือช่วนเกิดเจ็บไข้เลือดออกให้สัตว์กัด เช่น หายใจลำบาก หรือหายใจลำบากเป็นลั้น ถ้าผู้ป่วยมีประวัติไม่ครบถ้วนที่ ๓ ข้อดังที่กล่าวมา แพทย์จะฉีดยาป้องกันให้เข้ากล้ามเนื้อ และฝ่าตื้ออาการสัตว์ ๑๐ วัน เมื่อครบแล้วถ้าสัตว์ยังไม่ตายก็หยุดฉีดได้ แต่ถ้าสัตว์ตายหรือหายไปก่อนครบกำหนด ผู้ป่วยต้องได้รับยาฉีดจนครบ ส่วนในกรณีที่ผู้ป่วยมีประวัติครบทั้ง ๓ ข้อ แพทย์จะฉีดยาการข่องสัตว์ ๑๐ วัน ถ้าครบแล้วสัตว์ยังคงดี ไม่จำเป็นต้องฉีดยาป้องกัน แต่ถ้าสัตว์มีอาการมีดีบุก แพทย์จะฉีดยาป้องกันให้แก่สัมผัสโรคทันที และควรนำสัตว์สังเคราะห์
    ๓. ถ้าเป็นค้างคาว สัตว์ป่า หนู ลิง หรือสัตว์หาย (และสัตว์ต่างชนิดเช่นพืชพิษสุนัขบ้า) แพทย์จะฉีดยาป้องกันให้แก่ผู้สัมผัสโรคทันทีตามแนวทางการฉีดยาป้องกันแก่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าในหัวข้อด้านล่าง

“หลักสำคัญของการรักษา (ผู้ที่สัมผัส) โรคพิษสุนัขบ้า คือ การล้างแผลให้สะอาด การให้วัณโรคไมโกลบูลินเพื่อป้องกัน ทำการให้วัคซีนพิษสุนัขบ้าเพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานเชิงมากทำลายเชื้อโรคเอง”




IMAGE SOURCE : [www.mirror.co.uk](http://www.mirror.co.uk)

### วัคซีนพิษสุนัขบ้า

การให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies vaccine) มีจุดประสงค์เพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานขึ้นมา ทำลายเชื้อโรคเอง ซึ่งหลังการฉีดวัคซีนร่างกายจะใช้เวลาประมาณ ๑๐-๑๔ วัน จึงจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาพอที่จะทำลายเชื้อโรคได้


ในปัจจุบันแพทย์จะใช้วัคซีนบริสุทธิ์ที่ผลิตจากเซลล์เพาะเลี้ยงที่มีคุณภาพสูงและมีความปลอดภัยมากกว่าวัคซีนสมองสัตว์สมัยก่อน (ในประเทศไทยเลิกใช้ไปแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๕)

- ชนิดของวัคซีนพิษสุนัขบ้า วัคซีนที่ผลิตจากเซลล์เพาะเลี้ยงที่มีเชื้อยูในขณะนี้จะมีอยู่ด้วยกัน ๔ ชนิด ดังนี้
  ๑. วัคซีนเอชดีซีวี (Human diploid cell rabies vaccine – HDCV) มีชื่อทางการค้า คือ SII Rabivax® เป็นวัคซีนที่ได้จากการเพาะเลี้ยงไวรัสในเนื้อเยื่อปอดคน (Human diploid cell) มีลักษณะเป็นผงแห้งพร้อมน้ำสำหรับทำละลาย (Sterile water for injection) เมื่อละลายแล้ว จะมีลักษณะใสสีเข้มพู ปริมาณรวม ๑ มิลลิลิตร แนะนำให้อีดเข้ากล้ามเนื้อ (Intramuscular) เท่านั้น
  ๒. วัคซีนพีซีอีซีวี (Purified chick embryo cell rabies vaccine – PCECV) มีชื่อทางการค้า คือ Rabipur® เป็นวัคซีนที่ได้จากการเพาะเลี้ยงไวรัสในไข่ (Primary chick embryo fibroblast cell) มีลักษณะเป็นวัคซีนผงแห้งพร้อมน้ำสำหรับทำละลาย เมื่อละลายแล้วจะมีลักษณะใส ไม่มีสี ปริมาณรวม ๑ มิลลิลิตร สามารถบริหารยาได้ทั้งแบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (Intramuscular) และฉีดเข้าในขั้นผิวนัง (Intradermal)
  ๓. วัคซีนพีวีอาร์วี (Purified vero cell rabies vaccine – PVRV) มีชื่อทางการค้า คือ Verorab® เป็นวัคซีนที่ได้จากการเพาะเลี้ยงไวรัสในเซลล์เฉพาะชื่อ “เซลล์เวโร” (Vero cell) ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากไตรสี มีลักษณะเป็นวัคซีนผงแห้งพร้อมน้ำสำหรับทำละลาย เมื่อละลายแล้วจะมีลักษณะเป็นสารแurenทะกอนสีขาวขุ่นเล็กน้อย ปริมาณรวม ๑ มิลลิลิตร แนะนำให้อีดบริหารยาโดยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อเท่านั้น
  ๔. วัคซีนพีดีอีวี (Purified duck embryo cell rabies vaccine – PDEV) มีชื่อทางการค้า คือ Lyssavac N® เป็นวัคซีนที่ได้จากการเพาะเลี้ยงไวรัสในตัวอ่อนไข่เป็ดที่ฟักแล้ว (Embryonated duck eggs) มีลักษณะเป็นวัคซีนผงแห้งพร้อมน้ำสำหรับทำละลาย เมื่อละลายแล้วจะมีลักษณะเป็นสารแurenทะกอนสีขาวขุ่นเล็กน้อย ปริมาณรวม ๑ มิลลิลิตร แนะนำให้บริหารยาโดยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อเท่านั้น

- ขนาดและวิธีฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า องค์กรอนามัยโลกได้แนะนำให้ใช้สูตรการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบหลังสัมผัสโรคหรือสารสลายว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า (Post-exposure prophylaxis) เพียง ๑ สูตร\* (ในเด็กและผู้ใหญ่ใช้ในขนาดเดียวกัน) ได้แก่

- ฉีด HDCV หรือ PCECV ๑ มิลลิลิตร/เข็ม หรือฉีด PVRV ๐.๕ มิลลิลิตร/เข็ม เข้ากล้ามเนื้อตัว。  
แขนในผู้ใหญ่หรือที่ต้นขาในเด็กเล็ก ครั้งละ ๑ เข็ม ในวันที่ ๐ (วันแรก), วันที่ ๓ (ห่างจากวันแรก ๓ วัน), วันที่ ๗, วันที่ ๑๔ และ ๒๘ (หรือวันที่ ๓๐) รวมทั้งหมด ๕ เข็ม
- ฉีดวัคซีนชนิดเดชบีตหนึ่งเข้ากล้ามเนื้อต้นแขนตามขนาดตั้งกล่าวรวม ๕ เข็ม ในวันที่ ๐ (วันแรก)  
๒ เข็ม, วันที่ ๗ และวันที่ ๒๘ (หรือวันที่ ๒๘) วันละ ๑ เข็ม
- HDCV หรือ PCECV ๐.๖ มิลลิลิตร/จุล หรือฉีด PVRV ๐.๓ มิลลิลิตร/จุล เข้าใบชี้นิ้วหน้า ๒ จุด  
บริเวณต้นแขนซ้ายและขวาข้างละ ๑ จุด ในวันที่ ๐, ๓, ๗ และ ๒๘ (หรือ ๓๐)
- ฉีด HDCV หรือ PCECV ๐.๑ มิลลิลิตร/จุล เข้าใบชี้นิ้วหนัง ในวันที่ ๐ (วันแรก) จำนวน ๕ จุด  
โดยฉีดเข้าที่บริเวณต้นแขน ต้นขา บริเวณสะบักด้านหลัง ๒ ข้าง และหน้าท้องด้านล่าง ๒ ข้าง,  
ในวันที่ ๗ โดยฉีดเข้าที่ต้นแขนและต้นขา ๕ จุด, ในวันที่ ๓๐ และ ๙๐ วันละ ๑ จุด บริเวณที่ไม่มี  
ภูมิคุ้มกันได้และร่วนเร็ว และอาจนำมาก็ใช้ในการฉีดเมื่อยุนิกสูตรเดียวกับปีตี้

- การเปลี่ยนชนิดของวัคซีนและวิธีการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า โดยที่นำไปในรูปแบบใดของวัคซีน  
หรือวิธีการฉีด แต่ถ้ามีสาเหตุที่จำเป็น เฉพาะไปกรณีที่ฉีดเข้ากล้ามก็สามารถใช้วัคซีนเดียวกันได้
- ในกรณีที่ผู้ป่วยมารับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าไม่ครบ ให้ฉีดวัคซีนโดยนับต่อจากเข็มสุดท้ายที่ผู้ป่วย  
ได้รับ โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
- ผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า พบร่วมกับอาการแพ้ยาและไม่รุนแรง ที่อาจหายไป ต่อ  
ผลข้างเคียงเฉพาะที่ เช่น มีอาการปวด บวม แดง หรือคันตระบritch ที่ฉีด และอาจเป็นตุ่มนูนบริเวณที่ฉีด  
ผลข้างเคียงที่หายไป เช่น มีไข้ หนา ปวด รู้สึกไม่สบายตัว อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ บีบหัวใจ ปวดเมื่อย  
คลื่นไส้ ปอดห้องซี่สักจะหายไปได้เอง (ในการถ่ายที่มีไข้ไม่สบายตัว หรือรู้สึกปวดบริเวณที่ฉีด สามารถ  
รับประทานยาพาราเซตามอลเพื่อบรรเทาอาการได้) ผลข้างเคียงอื่น ๆ ที่พบเกิดได้น้อย เช่น ลมพิษ  
ผื่นคัน หรือภาวะแพ้วัคซีนพิษสุนัขบ้าบินครุณที่เรียกว่า ออกาไฟแลกซิส (Anaphylaxis)
- ข้อห้ามในการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า วัคซีนเหล่านี้ไม่ใช้ห้ามได้ ๑ ห้ามสัมผัสถึงยาที่ห้าม  
และแบบหลังสัมผัสโรค สามารถฉีดได้ทั้งในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยตับแข็ง และผู้ติดเชื้อเอชไอวี แต่ควรใช้ห้าม  
ความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีประวัติการแพ้ยาปฏิชีวนะ ( เพราะวัคซีนอาจมียาปฏิชีวนะ เช่น เดครอฟิโซลิน,  
โน莫ติซิน ตอกด่างจากกระบวนการผลิตยา) หรือแพ้โปรตีนสัตว์ปีก รวมถึงควรติดตามอาการภายนอกทั่วไป  
การได้รับวัคซีน เนื่องจากมีรายงานการเกิดภาระแพ้วัคซีนพิษสุนัขบ้าที่เรียกว่า ออกาไฟแลกซิส  
(Anaphylaxis) ซึ่งจะทำให้เกิดผื่นคันรุนแรง หายใจลำบาก หายใจลำบาก หายใจลำบาก หายใจ  
อาการดังกล่าวเกิดขึ้นควรรีบไปโรงพยาบาลทันที และหลีกเลี่ยงการได้รับวัคซีนในครั้งถัดไป แต่หากมี  
ความจำเป็นต้องใช้จะต้องได้รับการพิจารณาสั่งใช้จากแพทย์ด้านโรคภัยแพ้แล้วเท่านั้น
- ข้อควรระวังในการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ยาบางชนิดอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน  
ของร่างกายภายหลังให้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ เช่น ยาคอร์ติโคสเตอร์อยด์ (Corticosteroid), ยากดภูมิคุ้มกันชนิดอื่น ๆ (เช่น Cyclosporin), ยาต้านมาลาเรีย (เช่น Chloroquine)  
ซึ่งอาจทำให้เกิดความล้มเหลวในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อจะจากภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่สามารถต่อสู้  
ผลกระทบได้อย่างเต็มที่ เพราะผลกระทบจากยาตั้งกล่าวที่ให้อาญัตภูมิคุ้มกันเอาไว้ ตั้งนั้นอาจจำเป็นต้องตรวจหา  
ระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อพิษสุนัขบ้าเพื่อให้มั่นใจว่าอยู่ในระดับที่ป้องกันโรคได้ (๐.๕ ยูนิต/มิลลิลิตรขึ้นไป)  
นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับยาคอร์ติโคสเตอร์อยด์แบบระยะยาว หรือได้รับยากดภูมิคุ้มกันอื่น ๆ หรือใช้ยาต้าน  
มาลาเรีย, ผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง, ผู้บวชที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าแต่ไม่รับการรักษา  
ล่าช้า, ผู้ที่มีบาดแผลแกรนูลoma หรือมีแผลบาดเจ็บรุนแรงบริเวณศีรษะและคอ ไม่ควรได้รับการฉีดวัคซีนนี้เป็น<sup>\*</sup>  
ในชั้นผิวหนัง เนื่องจากการตอบสนองของภูมิคุ้มกันทางร่างกายต่อเชื้อพิษสุนัขบ้าอาจลดลงได้ ซึ่งแนะนำให้ฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อเท่านั้น



วัคซีนพิษสุนัขบ้า (Rabies vaccine)

IMAGE SOURCE : [www.cmmedicclinic.com](http://www.cmmedicclinic.com)

**หมายเหตุ :** ในประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้ใช้เพียง ๒ สูตร คือ สูตรที่ ๑ ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานแบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (รวม ๕ เข็ม) และสูตรที่ ๓ ซึ่งเป็นวิธีการฉีดเข้าในขั้นผิวนังตามสภาพกาชาดไทย (Thai Red Cross-ID) ซึ่งปริมาณวัคซีนที่ใช้อัดจะน้อยกว่าแบบที่ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ จึงทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า

### อัมมูนิโกลบูลินต้านพิษสุนัขบ้า

อัมมูนิโกลบูลินต้านพิษสุนัขบ้า (Rabies immune globulin – RIG) เป็นสารภูมิคุ้มกันต้านทานที่สามารถต้านเชื้อพิษสุนัขบ้าได้โดยตรง เพราะมีเชื้อพิษสุนัขบ้าเข้าสู่ร่างกายแล้ว จะแบ่งตัวเพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้วจะเดินทางเข้าไปสู่เส้นประสาทส่วนปลาย ซึ่งในช่วงนี้นี่เองถ้าให้การรักษาด้วยอัมมูนิโกลบูลินได้ทัน สารภูมิต้านทานนี้ก็จะเข้าไปทำลายเชื้อไม่ให้เข้าสู่เส้นประสาทได้ ผู้ป่วยจึงไม่เกิดเป็นโรคพิษสุนัขบ้า แต่ถ้าให้ช้าเกินไปรวมทั้งไม่ได้รับวัคซีนพิษสุนัขบ้าด้วย เชื้อก็จะเข้าสู่เส้นประสาทและทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในที่สุด

โดยแพทย์จะฉีดอัมมูนิโกลบูลินให้กับผู้ป่วยทุกรายที่มีความเสี่ยงของการล้มผัสโรคในระดับที่ ๓ ตั้งแต่ในวันแรกที่เริ่มฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า\* (แต่ถ้าไม่สามารถจัดหามาได้ในวันแรก ก็อาจให้ในวันอื่นก็ได้ หรือถ้าฉีดวัคซีนเข็มแรกมาแล้วเกิน ๗ วัน ก็ไม่จำเป็นต้องฉีด) โดยแพทย์จะฉีดอัมมูนิโกลบูลินเข้าสู่ร่อง ๔ แผลที่ถูกกัด แต่ถ้าไม่บาดแผล เช่น ถูกสัตว์เลี้ยงปากมาก็จะฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

ถ้าเป็นไปได้ควรเลือกใช้อัมมูนิโกลบูลินที่ผลิตจากคน (Human rabies immune globulin – HRIG) ก่อน ในขนาด ๒๐ หน่วยต่อน้ำหนักตัว ๑ กิโลกรัม แต่ถ้าไม่มีอาจใช้อัมมูนิโกลบูลินที่ผลิตจากม้า (Equine rabies immune globulin – ERIG) ในขนาด ๔๐ หน่วยต่อน้ำหนักตัว ๑ กิโลกรัม โดยแพทย์จะฉีดบริเวณแผลทุกแผลให้มากที่สุด (ฉีดทั้งในแผลและรอบแผล) และถ้ามีเหลือให้ฉีดเข้ากล้ามบริเวณต้นขาหรือสะโพก ไม่ควรนีดตรงตำแหน่งเดียวกับวัคซีน (รวมถึงไม่ควรใช้กระบอกฉีดยาอันเดียวกับวัคซีน) และขนาดที่ฉีดไม่ควรใช้เกินกว่าที่กำหนดไว้ เพราะอาจไปกดการสร้างภูมิคุ้มกันจากวัคซีนที่ฉีดได้ (อัมมูนิโกลบูลินที่ผลิตจากคนสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย (แต่ก็มีราคาแพงมาก) ส่วนอัมมูนิโกลบูลินที่ผลิตจากม้า อาจจำเป็นต้องทดสอบก่อนว่ามีโอกาสแพ้หรือไม่)

**หมายเหตุ :** สาเหตุที่ต้องฉีดอัมมูนิโกลบูลินร่วมกับวัคซีนพิษสุนัขบ้านั้นเป็นเพราะว่า อัมมูนิโกลบูลินที่ผู้ป่วยได้รับจะมีฤทธิ์เพียงชั่วคราว และหลังจากฉีดวัคซีนร่างกายจะใช้เวลาประมาณ ๑๐-๑๕ วัน ในการสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมา ทำลายเชื้อโรคได้

## แนวทางการฉีดยาป้องกันแก่ผู้สัมผัสรอครพิษสุนัขบ้า

๑. ผู้ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หรือเคยฉีดมาแล้วกว่า ๓ ครั้ง หรือวัคซีนที่เคยฉีดเป็นวัสดุในสมองสั่นสะเทือน แพทย์จะพิจารณาเรื่องความเสี่ยงของอาการสัมผัสรอครพิษสุนัขบ้า
    - ถ้ามีความเสี่ยงระดับที่ ๑ แพทย์จะฉีดให้เฉพาะวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า\* โดยไม่ต้องฉีดอีก มูนโกลบูลิน
    - ถ้ามีความเสี่ยงระดับที่ ๒ แพทย์จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า\* และฉีดอีมูนโกลบูลินให้
  ๒. ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบบีโองกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis) ครบๆ ๗วัน หรือเคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบหัสสัมผัสรอครพิษสุนัขบ้า (Post-exposure prophylaxis) อ่าอย่างน้อย ๓ ครั้ง ไม่ต้องฉีดอีมูนโกลบูลิน แต่ควรฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าด้วย
    - ถ้าเคยได้รับวัคซีนพิษสุนัขบ้ามาก่อนภายใน ๖ เดือน แพทย์จะฉีดวัคซีนกระตุ้นเข้าอกถ้ามหัวใจเต้นในชั้นผิวน้ำเพียง ๓ ครั้ง
    - ถ้าเคยได้รับวัคซีนพิษสุนัขบ้ามาเล็กๆ ก่อน ๖ เดือน แพทย์จะฉีดวัคซีนกระตุ้นเข้าอกถ้ามหัวใจเต้นชั้นผิวน้ำ ๒ ครั้ง ในวันที่ ๐ (วันแรก) และ ๗
  ๓. ผู้ที่มีการสัมผัสรอครพิษสุนัขบ้าเข้าในช่วงที่กำลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอยู่ ไม่จำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนกระตุ้นถูกมีดคุ้มกันอีก เพราะในชั่วขณะนี้ผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันเพียงพอในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แล้ว และไม่จำเป็นต้องฉีดอีมูนโกลบูลินเช่นกัน
- หมายเหตุ : จะหยุดฉีดเมื่อสั่น (เฉพาะสุนัขแคมเบรา) เป็นปกติชั่วระยะเวลา ก้าวขั้มเพื่อดูอาการ ๑๐ วัน

## วิธีรักษาโรคพิษสุนัขบ้า

ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาโรคพิษสุนัขบ้าให้หายขาดได้ การรักษาจึงทำได้เพียงดูแลรักษาไปตามอาการที่กำลังเป็น โดยหากพบผู้ป่วยที่มีอาการน้ำส่องสีขาวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ควรรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว

๑. ในรายที่มีประวัติและอาการชัดเจน เช่น ถูกสุนัขที่ตัด แผลมีอาการร้าวเนื้้า กล้าวคอม แพทย์จะให้การรักษาโดย
  - ตามอาการ เช่น ให้ยานอนหลับ ยาแก้ชา กันลารือหารแบบน้ำเข้าทางหลอดเลือด (เพรอะซิโอโนฟอร์ม รับประทานอาหารเองไม่ได้) และติดตามดูอาการใบจนกว่าผู้ป่วยจะเดินไหวได้
๒. ในรายที่แพทย์ยังไม่สามารถวินิจฉัยได้ถ่องแท้โดยพิเศษ เช่น การเจาะหลัง การตรวจอห Gebel เสื้อพิษสุนัขบ้า และการตรวจอหาสารภูมิต้านทานโรคด้วยวิธีต่างๆ การถ่ายภาพสมองด้วยเทคโนโลยีแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เป็นต้น และให้การดูแลรักษา รักษาอย่างเต็มที่ เช่น การใช้เครื่องช่วยหายใจในกรณีที่หยุดหายใจ การให้น้ำเกลือและปรับดูดอิเล็กโทรไลท์ จนกว่าจะพิสูจน์หาสาเหตุได้แน่ชัด เมื่อทราบสาเหตุแล้วแพทย์ก็จะให้การดูแลรักษาไปตามสาเหตุที่ตรวจพบ เช่น ผู้ป่วยที่มีอาการร้าวเนื้ออ่อนแรง หัวร้าวภายในที่สุดอาจพบว่าเป็นกลุ่มอาการกิลเลนบาร์เร (Guillain-Barré syndrome) ที่จะมีอาการร้าวขา ให้อาการดีขึ้นหรือลดช้าๆ ได้
๓. คำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า
  - ควรแยกผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าออกจากจากสิ่งเร้าต่างๆ
  - ผู้ที่อยู่ใกล้และผู้ป่วยควรใส่เสื้อห้ามย่างบีทชีด ใส่แวนต้า และหัวปิดจมูก เพื่อยืดหักการติดเชื้อจากผู้ป่วย

## วิธีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

๑. หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สุนัขหรือสัตว์ที่มีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า
๒. ระวังอย่าให้ถูกสุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงกัดหรือช้ำน และผู้ปกครองควรระวังอย่าให้เด็กเล่นกับสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดจนเกินไป โดยเฉพาะการกอดจูบสุนัข
๓. เมื่อพบสุนัขครอบครัวบ้าน ๆ ในวัยรุ่นดัง เพราะจะช่วยได้หากต้นให้สุนัขอยากร่าเริงมาก แต่เมื่อเป็นหนูน้อยหรือเด็กจะไม่รู้ว่าสุนัขเป็นสัตว์ที่ห้ามจูบ จึงอาจทำให้สุนัขที่มีสุนัขดู ให้เด็กจูบได้ ทำให้เด็กเสียหาย หรือสุนัขที่ไม่เคยจูบเด็กก็จะจูบเด็กได้ แต่เด็กจะไม่รู้ว่าสุนัขเป็นสัตว์ที่ห้ามจูบ
๔. ไม่วิ่งหรือซ่อนตัวในห้องที่สุนัขกำลังกินอาหารหรือนอนหลับ
๕. ไม่เล่นหรือหยอดสุนัขเพื่อความสนุกสนาน
๖. ถ้าพบสุนัขไม่ควรกัดสุนัขให้เด็กเสียหาย แต่ให้เด็กจูบไม่ใช่พอด้วยดูแลสุนัขให้ดี (ปกติเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี มักจะยังไม่สามารถจูบและสุนัขได้อย่างปลอดภัย)
๗. ไม่ควรกักซังสุนัขให้โดยการผูกเชือกหรือสัมโน่จลดา เพราะจะทำให้สุนัขมีนิสัยตุบติ
๘. ผู้ที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสุกี้ด้วยนมไม่ใช่สุนัข แมว กระรอก กระต่าย หนู ลิง ฯลฯ ควรพาสัตว์เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าตามที่สัตวแพทย์กำหนด
๙. อายุปล่อยให้สัตว์เลี้ยงมีคุณมาก และผู้เลี้ยงควรห้ามสุนัขทั้งตัวผู้และตัวเมีย
๑๐. สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ เช่น หมู วัว ควาย แกะ และ ม้า แม้ว่าจะพบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เหล่านี้ได้บ้าง แต่ก็ไม่พบว่ามีความสำคัญในการเข้าไวรัสมาสู่คนได้ จึงไม่จำเป็นต้องพาสัตว์ไปฉีดวัคซีน แต่ถ้าพบสัตว์เหล่านี้ก็ต้องไปรับการฉีดวัคซีน
๑๑. ผู้ที่เสี่ยงหรือทำงานที่เสี่ยงต่อการติดโรคนี้ เช่น ผู้ที่ดูแลสัตว์หรือสัตวแพทย์ เด็กที่ชอบเล่นกับสุนัข ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับสัตว์ ผู้ที่ขายสัตว์เลี้ยงขาย ร้านขายสัตว์ไม้เลี้ยง บุรุษไประษณีย์ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่กำจัดสุนัขและแมวบริษัท เจ้าหน้าที่บ้านสูงเคราะห์สัตว์พิการเรื่องต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ทำงานเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า สัตวแพทย์ ผู้ช่วยสัตวแพทย์ พยาบาลและพยาบาลที่พบผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าบอย ฯ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดของโรคนี้และเด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มีการระบาด เป็นต้น ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis) ก่อนถูกกัด โดยการฉีดวัคซีน HDCV หรือ PCFCV ๓ โดสต่อชา หรือ PVRV ๑.๕ มิลลิลิตร เช้าก่อนมื้อต้นอาหารจานแรก ๑ เข็ม หรือฉีดวัคซีนชนิดโดยน้ำด้วยหัวฉีด ๑.๑ มิลลิลิตร เช้าในชั้นเช้าหน้า ๑ ชุด บริเวณต้นแขน ใจวันที่ ๐, ๗ และ ๒๑ (หรือ ๒๕) เมื่อฉีดครบทั้ง ๓ เข็ม แล้วให้อีกว่าคราวบวัคซีนชุดแรก (Primary vaccination) และภายหลังการได้รับวัคซีนชุดแรกครบ ๑ เดือน ให้ทำการฉีดกระตุ้นเข้าอีก ๑ เข็ม จากนั้นให้ก่อภัต្តเข้าทุก ๆ ๕ ปี
  - คนกลุ่มนี้ถ้าถูกสัตว์ที่เป็นโรคหรือสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด ควรฉีดวัคซีนกระตุ้น ๒ ครั้ง ในวันที่ ๐ และ ๗
  - ส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าสูง หลังจากฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบป้องกันล่วงหน้าครบ ๓ เข็มแล้ว ควรตรวจสอบตัวบุญมีด้านหน้าทุก ๆ ๖ เดือน หรือทุก ๑-๒ ปี ถ้าพบว่ามีรอยตับต่างจากเกณฑ์ปลอมตัว (ต่ำกว่า ๐.๕ ยูนิต/มิลลิลิตร) ก็ควรฉีดวัคซีนกระตุ้นซ้ำ



IMAGE SOURCE : [www.startribune.com](http://www.startribune.com)

**หมายเหตุ :** ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบหลังสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ถูกสัตว์กัดหรือชewn) มาแล้ว ๑ ครั้ง เช่น ได้รับการฉีดในวันที่ ๐, ๓, ๗ และหยุดฉีดภายในห่างจากสัมผัสร่องรอยเดิม ๑๐ วันแล้วพบว่าเป็นปกติ ให้อีก เสมือนว่าเป็นการฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบป้องกันล่วงหน้า

### คำแนะนำและข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

- เมื่อถูกสัตว์ที่เป็นโรคหรือสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด ชewn หรือสัมผัสใกล้ชิด ควรรีบฟอกล้างแผลด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที และรีบไปที่สถานพยาบาลใกล้บ้านทันทีเพื่อรับการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง รวมทั้งฉีดยาป้องกัน ผู้ป่วยไม่ควรรักษาด้วยตนเองโดยใช้วิธีพ่นบ้านหรือปล่อยประ紧跟ไม่ไปรักษาเป็นอันขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถูกสูญเสียกัดหรือชewn ก็ไม่ควรประมาทว่าจะไม่เป็นอะไร
- ในบางครั้งพบว่าหลังจากถูกสัตว์กัดหรือชewn แม้จะไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องก็ไม่เห็นเป็นอะไรหรือมีอันตรายใด ๆ ก็อาจทำให้เกิดความประมาทได้ แต่ความจริงแล้วผู้ที่ถูกสัตว์กัดหรือชewn ไม่จำเป็นต้องเป็นโรคนักนุกราย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสัตว์ที่กัดไม่มีเชื้อพิษสุนัขบ้า หรืออาจได้รับเชื้อเพียงจำนวนน้อย หรือบาดแผลมีความรุนแรงน้อยจนไม่ทำให้เกิดโรคก็เป็นได้
- ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis) คือ หากถูกสัตว์กัด การฉีดวัคซีนกระตุนอีกเพียง ๑-๒ เข็ม ร่างกายก็จะมีภูมิคุ้มกันทางที่สูงพอในการป้องกันโรคอย่างได้ผล รวมทั้งไม่เสี่ยงต่อการแพ้หรือเจ็บปวดบริเวณแผลจากการฉีดอีมมูนโกลบูลิน
- แม้จะยังไม่มีข้อพิสูจน์ว่าโรคนี้สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้อย่างชัดเจน แต่ก็มีรายงานพบผู้ป่วยที่ติดโรคนี้จากการปลูกถ่ายกระจาดตาหรืออวัยวะ ดังนั้น เมื่อมีการสัมผัสถกับผู้ป่วย เช่น ถูกผู้ป่วยกัด เยื่อบุหรือบาดแผลไปสัมผัสถูกสิ่งคัดหลังของผู้ป่วย ก็ควรปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาฉีดยาป้องกันแบบเดียวกับการสัมผัสริจิกส์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า
- โรคนี้ถ้ามีอาการแสดงแล้ว (เชื้อพิษสุนัขบ้าเข้าสู่เส้นประสาทส่วนปลายได้แล้ว) ผู้ป่วยมักจะเสียชีวิตทุกราย เพราะในปัจจุบันยังไม่มียาตัวไหนหรือวิธีรักษาใดที่จะช่วยเข้าไว้รักษาให้หายได้ (แม้ว่าแพทย์จะให้การดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดีในห้องไอซี尤 (ICU) ก็ตาม และแม้จะเคยมีรายงานว่ามีผู้ป่วยที่รอดชีวิต แต่ที่ผ่านมาทั่วโลกมีผู้ป่วยที่รอดชีวิตเพียง ๖ รายเท่านั้น โดยใน ๕ รายนั้นมีประวัติว่าได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาก่อน ส่วนอีก ๑ รายไม่เคยได้รับวัคซีน แต่ติดเชื้อมาจากการค้างคาว ด้วยเหตุนี้จึงมีการตั้งข้อสังเกตว่า เชื้อพิษสุนัขบ้าสายพันธุ์ที่มีอยู่ในค้างคาวอาจก่อโรคได้ไม่รุนแรงเท่าสายพันธุ์ที่มีอยู่ในสุนัข) และประกอบกับการที่ผู้ป่วยในบ้านเรามักจะไม่ได้รับการฉีดยาป้องกันโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นส่วนใหญ่ อัตราการเสียชีวิตจึงคิดเป็น ๑๐๐%

- หญิงตั้งครรภ์สามารถตั้งครรภ์ได้ตั้งแต่ปีก่อนโรคพิษสุนัขบ้าและอัมมูนิโกลบูลินได้โดยไม่มีผลซ้ำซ้อนเดียวกัน หากในครรภ์
- วันที่ ๒๕ กันยายน ของทุกปี คือ “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ซึ่งในวันดังกล่าวจะมีการจัดงานและรณรงค์ให้ความรู้เรื่องพิษสุนัขบ้าแก่เยาวชนอย่างแพร่หลายทั่วโลก หัวนี้เพื่อเป็นการสร้างตัวและเป็นเกียรติแด่ หลุยส์ ปาสเทอร์ (Louis Pasteur) ซึ่งเป็นผู้คิดค้นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่เสียชีวิตไปเมื่อวันที่ ๔๘ กันยายน พ.ศ.๒๔๗๙
- โรคพิษสุนัขบ้าสามารถพบได้ตลอดทั้งปี ไม่ใช่เฉพาะหน้าร้อนอย่างที่หลายคนเข้าใจ เพราะโรคนี้เกิดจาก เชื้อไวรัส ไม่ใช่เกิดจากความเครียดที่มาจากการน้ำฝน
- ผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคนี้ส่วนใหญ่เป็นเพราະถูกกัดโดยสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่มีเจ้าของแต่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- จากสถิติพบว่า ผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าจะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
- กว่า ๙๐% ของผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคนี้ เป็นเพราະผู้ป่วยไม่พบแพทย์เพื่อรับการฉีดวัคซีนหลังจากถูกสัตว์ กัด
- โปรดทราบว่า “การช่วยเหลือสุนัขจรจัดโดยการให้อาหาร แต่ไม่นำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าและคุมกำเนิด จะเป็นการเพิ่มจำนวนสุนัขจรจัดและแพร่กระจายโรคพิษสุนัขบ้า”
- ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าที่พบบ่อย เช่น โรคพิษสุนัขบ้าเป็นเฉพาะในสุนัขเท่านั้น, หลังถูก กัดให้ติดนานนัดจะหายรักษาโรคไม่ได้, เมื่อถูกสุนัขกัดให้ตัดหูตัดหางดูนั้นจะช่วยให้สุนัขไม่เป็นโรคนี้, เมื่อ ถูกสุนัขกัดให้ผ่าสุนัขให้ตายแล้วเอาตับสุนัขมากินจะไม่ป่วยเป็นโรคนี้, คนท้องห้ามฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า, วัคซีนพิษสุนัขบ้าที่ฉีดรอบเดือน ๑๖ เดือน หรือ ๒๑ เดือน ถ้าหยุดฉีดต่อไปรึไม่ฉีด ก็จะ ความเชื่อเหล่านี้จะทำให้ผู้ที่ถูกสุนัขที่มีเชื้อกัดໄไปหากแบบที่ฉีดเชิงชล ป้องกันและทำให้เสียชีวิตในเวลา ต่อมา
- หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อไปที่ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์  
โทร. ๐๘-๖๔๓-๔๔๔๔ ต่อ ๔๗๘๘

## สถานที่บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า

### ๑. กรุงเทพมหานคร

- ศูนย์โรคพิษสุนัขบ้า กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี
- ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ทางแพทย์ทหาร ถนนไชยวัฒน์ เขตราชเทวี
- สถาบันสุขภาพ สถาบันภาษาไทย
- ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

### ๒. ภาคกลาง

- สถาบันวิจัยไบวัช กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรี
- สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ ๑ จังหวัดปทุมธานี
- สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ ๗ จังหวัดนครปฐม
- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
- หน่วยขับสูตรสาธารณสุขเขต จังหวัดสระบุรี
- โรงพยาบาลสระบุรี

### ๓. ภาคตะวันออก

- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดชลบุรี
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ อำเภอปันบีง จังหวัดชลบุรี
- โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
- หน่วยทันสุธรรมชาติและสุขอนามัยที่ ๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา
- สำนักสุขศาสตร์และสุขอนามัยที่ ๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา

### ๔. ภาคเหนือ

- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดพิษณุโลก
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
- โรงพยาบาลสวรรค์ประชาธิรักษ์ จังหวัดพิษณุโลก
- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์
- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ อำเภอห้างหุ้นส่วน จังหวัดลำปาง
- โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่
- สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ ๕ จังหวัดเชียงใหม่
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

### ๕. ภาคอีสาน

- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดนครราชสีมา
- สำนักสุขศาสตร์และสุขอนามัยที่ ๖ จังหวัดนครราชสีมา
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดขอนแก่น
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ท่าพอง จังหวัดขอนแก่น
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ จังหวัดสุรินทร์
- โรงพยาบาลสุรินทร์บรมราชคฤห์ จังหวัดสุรินทร์
- โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิรัตน์
- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

### ๖. ภาคใต้

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- สำนักสุขศาสตร์และสุขอนามัยที่ ๔ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- สำนักสุขศาสตร์และสุขอนามัยที่ ๕ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดสงขลา

### เอกสารอ้างอิง

๑. หนังสือสำราการตรวจรักษาโรคที่๒ใบ ๒. “โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)”, (บพ.สุรเกียรติ อากาโนะ ภานุ), หน้า ๕๘๙-๕๙๗.
๒. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, “โรคพิษสุนัขบ้า”, [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก : [www.med.cmu.ac.th](http://www.med.cmu.ac.th), [๑๖ พ.ย. ๒๐๑๖].
๓. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, “โรคพิษสุนัขบ้า ร้ายแรง แต่ป้องกันได้!”, [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก : [www.pharmacy.mahidol.ac.th](http://www.pharmacy.mahidol.ac.th), [๑๖ พ.ค. ๒๐๑๖].
๔. หาหมอดอทคอม, “โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)”, (บัญชีสิ่ง ศิริอุตมลักษณ์), [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก : [haamor.com](http://haamor.com), [๑๖ ม.ค. ๒๐๑๗].
๕. หาหมอดอทคอม, “วัคซีนพิษสุนัขบ้า (Rabies vaccine)”, (ถูกวิจัยแล้ว), [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก : [haamor.com](http://haamor.com), [๑๖ ม.ค. ๒๐๑๗].
๖. หาหมอดอทคอม, “การปฐมพยาบาล การดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้า”, (ศ.พญ. อรุณี ใจดี สุภาพ), [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก : [haamor.com](http://haamor.com), [๑๖ ม.ค. ๒๐๑๗].

ข้อมูลจาก <https://medthai.com/โรคพิษสุนัขบ้า/>